

Fibroma eltávolítás

A fibroma a bőr felületén kialakuló, keményebb vagy puhább, gyakran nyeles jellegű, jóindulatú bőrelváltozás. Színe lehet a bőrrel megegyező, de néha barnásan elszíneződött. A fibroma eltávolítása lézerrel mindössze néhány perces, biztonságos beavatkozás.

Fibroma kialakulásának okai

Kiváltó oka ismeretlen. Leggyakrabban hajlatokban (nyak, hónalj, lágyéktáj) alakul ki, hajas fejbőrön is megjelenhet.

A fibroma mindig jóindulatú bőrelváltozás, nem tekinthető valódi megbetegedésnek. Leginkább kozmetikai problémát okoz, elsősorban a látható testfelületeken. Ékszer, ruha okozta sérülés kapcsán fájdalom és felületes, enyhe gyulladás alakulhat ki benne.

Fibroma eltávolítása házilag

Illendő megemlíteni a régi időkben származó eltávolítási technikát, amikor a nyeles fibromát a tövével cérnával vagy még régebben lószőrrel elkötötték. Amennyiben sikerül teljesen a töben elvégezni a lekötést, akkor a fibroma néhány nap alatt elhal és leesik.

Fibroma eltávolítása fagyasztással

Korszerűbb eljárásnak számít a fagyasztás, azonban ennek a hátránya, hogy az ép, fibroma körüli terület is fagyási sérülést szenved.

Fibroma eltávolítása lézerrel

A lézerrel történő fibroma eltávolítás kiváló kozmetikai eredményt biztosít. A környezet nem károsodik. Heg nélküli, nyomtalanul gyógyul.

A beavatkozás helyi érzéstelenítésben történik, de az apróbb fibrómák érzéstelenítés nélkül is eltávolíthatóak, mert a rendkívül rövid ideig tartó lézer behatás okozta fájdalom kisebb, mint egy tűszúrás.

Egy kezelés alkalmával egyszerre 10-20 db elváltozás is eltávolítható a fibrómák nagyságától függően. Utókezelést a beavatkozás nem igényel. A pontszerű sebeket folyóvíz érheti, csupán a hosszabb ideig tartó áztatás (pl. uszoda) kerülendő.