

Hagyományos sebészeti beavatkozások

Bőrelváltozások kimetszése. Dermatoscopos vizsgálat után, ha szövettani vizsgálatot is igénylő, nagy elváltozást látunk, akkor hagyományos sebészeti módszerrel távolítjuk el az elváltozást. A szövettani vizsgálat eredménye általában egy-két hetet vesz igénybe.

Visszeres panaszok kezelése. Fizikális vizsgálatot követően több lehetőséget ajánlunk fel a visszerek kezelésére:

- Konzervatív kezelés: gyógyszeres kezelés és kompressziós pólya használata (fásli)
- Műtéti kezelés: a tágult visszér ágak sebészeti eltávolítása
- Injectiós (úgynevezett szklerotizáló) kezelés.

Egyéb hagyományos sebészeti problémák kezelése, beavatkozások végzése. Ennek keretében számos végbél-táji megbetegedés ellátása történhet.

A műtétek helyi, infiltrációs érzéstelenítésben történnek a műtéti bőrfelszín fertőtlenítése, sebészi izolálása után. A sebet plasztikai elveket figyelembe véve varrattal, bizonyos esetekben ragasztócsíkkal zárjuk. A további ellenőrzést és a varratszedés időpontját a beavatkozás elvégzése után egyeztetjük. A kontroll vizsgálatok során van lehetőség az esetleges szövettani eredmény és a további teendők megbeszélésre.